



## Avtozma® ▼ (Tocilizumab) Patientenpass

Diese Karte gilt sowohl für pädiatrische als auch für erwachsene Patienten. Bitte entsprechend verwenden.

**Diese Patienteninformationskarte enthält wichtige Sicherheitshinweise, die Patienten oder Eltern/Erziehungsberechtigte von Patienten vor, während und nach der Behandlung mit Avtozma kennen müssen. Die Behandlung mit Avtozma kann als intravenöse (IV) Infusion oder subkutane (SC) Injektion verabreicht werden.**

- Zeigen Sie diese Karte ALLEN medizinischen Fachkräften, die an Ihrer Behandlung beteiligt sind.
- Weitere Informationen finden Sie in der Avtozma-Produktinformation, die Ihrem Arzneimittel beiliegt, und in der Avtozma-Patientenbroschüre.

### Allgemeines

Als Patient mit rheumatoider Arthritis (RA), polyartikulärer oder systemischer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA/sJIA) kann Ihre Behandlung als IV-Infusion oder SC-Injektion verabreicht werden. Als Patient mit Riesenzellerarthritis (GCA) wird Ihre Behandlung ausschließlich als SC-Injektion verabreicht. Als COVID-19-Patient wird Ihre Behandlung ausschließlich als IV-Infusion verabreicht.

### Infektionen

Avtozma kann eine bestehende Infektion verschlimmern oder das Infektionsrisiko erhöhen. Sie sollten Avtozma nicht erhalten, wenn Sie eine aktive schwere Infektion haben. Darüber hinaus können einige frühere Infektionen bei der Anwendung von Avtozma wieder auftreten.

### Patienten und Eltern/Erziehungsberechtigte von sJIA- oder pJIA-Patienten sollten...

- Bei Anzeichen/Symptomen (wie anhaltendem Husten, Gewichtsverlust, leichtem Fieber), die auf eine Tuberkuloseinfektion (TB) hindeuten, während oder nach der Behandlung mit Avtozma ärztlichen Rat einholen. Vor der Behandlung mit Avtozma sollten Sie untersucht worden sein und keine aktive TB aufweisen.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über eventuell erforderliche Impfungen, bevor Sie mit der Behandlung mit Avtozma beginnen.
- Informieren Sie Ihren Arzt unverzüglich, wenn Sie Anzeichen oder Symptome einer Infektion bemerken. Einige Infektionen können sehr schwerwiegend werden und eine sofortige Behandlung und einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen.

- Fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie Ihre nächste Behandlung verschieben sollten, wenn Sie zum Zeitpunkt der geplanten Behandlung an einer Infektion (auch einer Erkältung) leiden.
- Jüngere Kinder mit pJIA/sJIA sind möglicherweise weniger in der Lage, ihre Symptome zu kommunizieren. Daher sollten Eltern/Erziehungsberechtigte von pJIA- oder sJIA-Patienten sofort ihren Arzt kontaktieren, wenn sich ihr Kind ohne ersichtlichen Grund unwohl fühlt.

## **Komplikationen bei Divertikulitis**

Bei Patienten, die Avtozma anwenden, können Komplikationen einer Divertikulitis auftreten, die ohne Behandlung schwerwiegend werden können.

- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn Sie Fieber und anhaltende Bauchschmerzen oder Koliken mit Veränderungen der Darmgewohnheiten entwickeln oder Blut im Stuhl bemerken.
- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an Darmgeschwüren oder Divertikulitis (Entzündung in Teilen Ihres Dickdarms) leiden oder gelitten haben.

## **Hepatotoxizität**

Die Behandlung mit Avtozma kann häufig zu einem Anstieg bestimmter Blutwerte führen, die als „Leberenzymwerte“ bezeichnet werden und zur Messung der Leberfunktion herangezogen werden. Die Veränderungen dieser Leberenzymwerte werden während der Behandlung mit Avtozma regelmäßig überwacht.

In seltenen Fällen traten bei Patienten schwerwiegende, lebensbedrohliche Leberprobleme auf, von denen einige eine Lebertransplantation erforderlich machten.

Seltene Nebenwirkungen, die bei bis zu 1 von 1.000 Patienten auftreten können, die Avtozma erhalten, sind Leberentzündung (Hepatitis) und Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut).

In sehr seltenen Fällen (bei 1 von 10.000 Patienten, die Avtozma erhalten) kann es zu Leberversagen kommen.

- **Informieren Sie sofort Ihren Arzt**, wenn Sie eine Gelbfärbung der Haut und der Augen bemerken, dunkelbraunen Urin haben, Schmerzen oder Schwellungen im rechten Oberbauchbereich verspüren oder sich sehr müde und verwirrt fühlen.
- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an einer Lebererkrankung leiden, bevor Sie Avtozma erhalten.

**Bewahren Sie diese Karte mindestens 3 Monate nach der letzten Avtozma-Dosis auf**, da Nebenwirkungen noch einige Zeit nach der letzten Avtozma-Dosis auftreten können. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken und in der Vergangenheit mit Avtozma behandelt wurden, wenden Sie sich an einen Arzt, um Rat zu erhalten.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das Pflegepersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das *Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), Traisengasse 5, 1200 Wien, [nebenwirkung@basg.gv.at](mailto:nebenwirkung@basg.gv.at)* melden. Durch die Meldung von Nebenwirkungen können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

**Daten der Behandlung mit Avtozma:\***

**Beginn:**

---

**Verabreichungsweg:**                     IV  SC

---

*\*Bitte bringen Sie bei jedem Besuch bei einem Arzt auch eine Liste aller anderen Medikamente mit, die Sie einnehmen.*

**Name des Patienten/Elternteils/Erziehungsberechtigten:**

---

**Name des Arztes:**

---

**Telefonnummer des Arztes:**

---