

# Td-IMMUN<sup>1</sup>

Injektionssuspension in einer Fertigspritze



## Begleitmaßnahme bei Wundmanagement<sup>2</sup>



**Erwiesener Schutz** vor Tetanus und Diphtherie für  
alle Altersgruppen ab 5 Jahren<sup>1</sup>

Bestellungen in Deutschland:

**Öffentliche Apotheken:** wie gewohnt bei dem pharmazeutischen Großhandel Ihres Vertrauens

**Großhändler und Kliniken:** bei NextPharma Logistics GmbH

E-Mail: [cs-logistics-order-de@nextpharma.com](mailto:cs-logistics-order-de@nextpharma.com), EDI-Nummer: 94581595

**ASTRO PHARMA** 



# Td-IMMUN<sup>1</sup>

Injektionssuspension in einer Fertigspritze



**Empfehlungen zu Td-Impfstoffen** (Tetanus und Diphtherie mit reduziertem Antigengehalt) aus dem **RKI Epidemiologischen Bulletin 04/2026:**<sup>2</sup>

- **Diphtherie-Komponente** ab dem **Alter von  $\geq 5$  Jahren** - grundsätzliche Verwendung<sup>2</sup>
  - Ab einem Alter von  $\geq 5$  Jahren sollen für Impfungen gegen Diphtherie Impfstoffe mit **reduzierter Antigenmenge** verwendet werden. Dies wird durch das kleine „d“ in der Bezeichnung (Td) gekennzeichnet.
  - **Td-IMMUN** mit den Toxoid-Komponenten **Tetanus (T) und Diphtherie (d)** ist explizit ab dem 5. Geburtstag für die Anwendung zugelassen.<sup>1</sup>
- Standard- und regelmäßige **Auffrischimpfungen zu Diphtherie/Tetanus**<sup>2</sup>
  - **Regelmäßige Auffrischung - Altersgruppen:**
    - Erste Auffrischung (A1): im Alter von **5 bis 6 Jahren**
    - Zweite Auffrischung (A2): im Alter von **9 bis 16 Jahren**
    - Danach: **alle 10 Jahre** als Standardimpfung für alle Erwachsenen
  - Die nächst-fällige Auffrischimpfung wird von der STIKO **einmalig als Kombination mit Pertussis** empfohlen.
- Empfehlungen zu **Nachholimpfungen bei unvollständigem oder unbekanntem Impfstatus** (Kindern, Jugendliche und Erwachsene)<sup>2</sup> (Tab 11 C-E)

Td-IMMUN Dosierungsschema für die Kitteltasche ( $\geq 5$ Jahre)	Mindestabstand in Monaten zur vorangegangenen Impfstoffdosis <sup>#</sup>			Auffrischung Impfintervalle	
	0	1	6		
Tetanus (T)	N1	N2	N3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-17 Jahre: A1<sup>a</sup></li> <li>• <math>\geq 11</math> bis <math>&lt; 18</math> Jahre: A1 (alle 5-10 Jahre)</li> <li>• <math>\geq 18</math> Jahre: A (alle 10 Jahre)</li> </ul>	
Diphtherie (d)	N1	N2	N3		

<sup>#</sup> Bei einigen Impfstoffen werden in den Fachinformationen andere Mindestabstände angegeben.

A: Auffrischimpfung; N 1-3: nachzuholende Impfdosen (N1: Start; N2: Auffrischung; N3: Abschluss Grundimmunisierung)

<sup>a</sup> Je nach Alter bei Abschluss der Grundimmunisierung sind auch 2 Auffrischimpfungen bis zum Erreichen des Erwachsenenalters möglich (Abstand zwischen G und A1 sowie A1 und A2 jeweils 5 – 10 Jahre).

## Td-IMMUN – Impfung

- erfüllt die Sorgfaltspflicht für Tetanus und schließt gleichzeitig die Diphtherie-Versorgungslücke<sup>1-3</sup>
- gewährleistet die Verwendung eines Impfstoffes mit zugelassener Indikation im Bereich "Tetanusprophylaxe bei Personen ab einem Alter von 5 Jahren mit tetanusgefährdeten Verletzungen mit gleichzeitiger Immunisierung gegen Diphtherie"<sup>1</sup>
- nahezu natriumfrei ( $< 1$  mmol [23 mg]/Dosis)<sup>1</sup> und kann somit auch bei natriumkontrollierten Patient:innengruppen zum Einsatz kommen
- ermöglicht eine Reise in ein Diphtherie-Infektionsgebiet frühestens nach der 2. Impfstoffdosis<sup>2</sup>

**Referenzen:** **1** Td-Immune Fachinformation, Stand 09/2025. | **2** Paul-Ehrlich-Institut: Epidemiologisches Bulletin 4/2026 vom 22. Januar 2026. | **3** Impfquoten in Deutschland: Begleitfolien zu aktuellen Ergebnissen aus dem RKI-Impfquotenmonitoring 11.12.2025 Robert Koch-Institut Fachgebiet Impfprävention/STIKO 11.12.2025.



# Td-IMMUN<sup>1</sup>

Injektionssuspension in einer Fertigspritze

## Td-IMMUN: Bivalenter Impfstoff in Unfallambulanz und Notaufnahme




### Postexpositionelle Prophylaxe (im Verletzungsfall)

- Bei jeder **Verletzung (auch Bagatelverletzungen) soll der Tetanus-Impfstatus überprüft** werden.<sup>2</sup> Der bivalente Impfstoff **Td-IMMUN bietet eine effiziente Möglichkeit**, den Tetanus- und Diphtherie Impfschutz zeitgleich aufzufrischen.<sup>1</sup>
- Je nach Zeitpunkt der letzten Impfung und Art der Wunde ist eine Td-Impfung unverzüglich durchzuführen.<sup>2</sup> Fehlende Impfungen zur Vervollständigung der Grundimmunisierung sind unbedingt nachzuholen.<sup>2</sup>

### Impfschutz-Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen bei Verletzungen - Referenzjahr 2024<sup>3</sup>

- Eine Auffrischimpfung gegen Diphtherie, Tetanus (Wundstarrkrampf) und Pertussis (Keuchhusten) wird für Kinder im Alter von 5–6 Jahren empfohlen.
- Nur **50%** der Kinder erhielten im Jahr 2024 die für sie empfohlene Auffrischimpfung.
- Bei Jugendlichen lag die Quote bei **57%**.
- Lediglich **43%** erhielten die Auffrischimpfung im Kindes- und Jugendalter.



## Td-IMMUN - Vorteile in der Notfall- und Traumaversorgung

Kriterium	Td-IMMUN (Bivalenter Td-Impfstoff)	Trivalenter Impfstoff (TdaP)	Vorteile mit Td-IMMUN
Ökonomie	individuelle Rahmenverträge überprüfen		große Budgetentlastung möglich
Lieferstabilität	<b>verlässlich</b> Herstellung in Europa <sup>6</sup>	oftmalige Engpässe in 2024/2025 <sup>4</sup>	hohe Versorgungssicherheit
Einsatzbereich	Tetanusprophylaxe bei Verletzungen lt. Indikation <sup>1</sup>	Im Wundmanagement: <sup>5</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetanusprophylaxe notwendig</li> <li>• keine Unterstützung durch Pertussiskomponente</li> </ul>	Bei Unfall/Notfall: <ul style="list-style-type: none"> <li>• patient:innengerecht</li> <li>• budgetgerecht</li> </ul>

**Referenzen:** **1** Td-Immun Fachinformation, Stand 09/2025. | **2** Paul-Ehrlich-Institut: Epidemiologisches Bulletin 4/2026 vom 22. Januar 2026. | **3** Impfquoten in Deutschland: Begleitfolien zu aktuellen Ergebnissen aus dem RKI-Impfquotenmonitoring 11.12.2025 Robert Koch-Institut Fachgebiet Impfprävention/STIKO 11.12.2025. | **4** <https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/lieferengpaesse/archiv-lieferengpaesse-humanimpfstoffe/2025/archiv-2025-inhalt.html?nn=175332> (zuletzt abgerufen am 12.02.2026) | **5** <https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.839503&portal=bvaebbportal> (zuletzt abgerufen am 12.02.2026) | **6** Td-Immun Gebrauchsinformation, Stand 09/2025

Auffrischimpfung  
für Kinder ab  
5 Jahren<sup>1</sup>



## Td-IMMUN - Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall

- Aktive Immunisierung gegen Tetanus und Diphtherie (ab einem Alter  $\geq 5$  Jahre)<sup>1</sup>
- Auffrischimpfung für Kinder  $\geq 5$  Jahre<sup>1</sup>
- Grundimmunisierung bei Personen mit fehlender, unvollständiger oder unbekannter Grundimmunisierung<sup>1</sup>

### Td-IMMUN Injektionssuspension am Markt<sup>7</sup>

Pkg.-Größe	PZN
10 Stk.	19815182
1 Stk.	19802280

#### Referenzen

**1** Td-Immune Fachinformation, Stand 09/2025. | **2** Paul-Ehrlich-Institut: Epidemiologisches Bulletin 4/2026 vom 22. Januar 2026. | **3** Impfquoten in Deutschland: Begleitfolien zu aktuellen Ergebnissen aus dem RKI-Impfquotenmonitoring 11.12.2025 Robert Koch-Institut Fachgebiet Impfprävention/STIKO 11.12.2025. | **4** <https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/lieferengpaesse/archiv-lieferengpaesse-humanimpfstoffe/2025/archiv-2025-inhalt.html?nn=175332> (zuletzt abgerufen am 12.02.2026) | **5** <https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.839503&portal=bvaebportal> (zuletzt abgerufen am 12.02.2026) | **6** Td-Immune Gebrauchsinformation, Stand 09/2025 | **7** Lauer Taxe 02/2026

#### Kurzfassung der Fachinformation:

**Pharmazeutischer Unternehmer:** AJ Vaccines A/S, Artillerivej 5, DK-2300 Kopenhagen S, Dänemark; **Vertrieb in Deutschland:** Astro-Pharma GmbH, Allerheiligenplatz 4, 1200 Wien, Österreich

**Bezeichnung des Arzneimittels:** Td-IMMUN, Injektionssuspension, Einzeldosis-Fertigspritze. Diphtherie- und Tetanus-Impfstoff (adsorbiert, reduzierter Antigenhalt) **Qual. und quant. Zusammensetzung:** Eine Dosis (0,5 ml) enthält: Diphtherie-Toxoid, gereinigt<sup>1</sup> 6,25 Lf /  $\geq 2$  I.E., Tetanus-Toxoid, gereinigt<sup>1</sup> 6,25 Lf /  $\geq 20$  I.E. <sup>1</sup> adsorbiert an hydratisiertes Aluminiumhydroxid (Al(OH)<sub>3</sub>) entsprechend 0,5 mg Aluminium (Al<sup>3+</sup>). Die Diphtherie- und Tetanus-Toxine, aus Kulturen von *Corynebacterium diphtheriae* und *Clostridium tetani*, sind gereinigt und inaktiviert. Zur Herstellung der Impfstoffe wurden keine Materialien menschlichen Ursprungs verwendet. Der Impfstoff kann Spuren von Formaldehyd enthalten, das im Herstellungsprozess verwendet wird (siehe Abschnitt 4.4). Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Liste der sonstigen Bestandteile. **Anw.:** Aktive Immunisierung gegen Tetanus und Diphtherie bei Personen ab einem Alter von 5 Jahren. Auffrischimpfung gegen Diphtherie und Tetanus sowie Grundimmunisierung bei Personen mit fehlender, unvollständiger oder unbekannter Grundimmunisierung. Tetanusprophylaxe bei Personen ab einem Alter von 5 Jahren mit tetanusgefährdeten Verletzungen mit gleichzeitiger Immunisierung gegen Diphtherie. Td-IMMUN sollte gemäß den offiziellen nationalen Empfehlungen verabreicht werden. **Gegenanz.:** Schwere Nebenwirkungen nach einer zurückliegenden Impfung mit dem Impfstoff oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. **Nebenw.:** Rötungen und Schwellungen an der Injektionsstelle sowie Fieber sind die häufigsten Nebenwirkungen. Diese treten üblicherweise innerhalb der ersten 48 Stunden nach Impfung auf. Sehr häufig: Kopfschmerzen, Rötung/Schwellung, Schmerzen, Jucken an der Injektionsstelle, Ermüdung. Häufig: Schwindelgefühl, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Myalgie, Unwohlsein, Fieber  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , Rötung/Schwellung  $\geq 5$  cm an der Injektionsstelle. Gelegentlich: Ekzem und Dermatitis. Selten: Überempfindlichkeit einschließlich anaphylaktische Reaktionen, Urtikaria-Reaktionen, Hohes Fieber  $>40^{\circ}\text{C}$ , Granulom oder steriler Abszess an der Injektionsstelle. Sehr selten: Vasovagale Synkope. Kinder und Jugendliche: Die Sicherheitsauswertung von Td-IMMUN in klinischen Studien umfasst Kinder im Alter ab 4 Jahren und Jugendliche. **Meldung des Verdachts auf Nebenw.:** Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Straße 51 – 59, 63225 Langen, Telefon +49 6103 77 0, Telefax: +49 6103 77 1234, Website: [www.pei.de](http://www.pei.de), anzuzeigen.

**Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Td-IMMUN die Fachinformation!**



QR-Code scannen, Fachinformation erhalten: